## チャンピックス®禁煙患者さん再診用チェックシート

様 BIRTHDAY MTSH 年 NAME 歳 調剤年月日 Н 年 Н 年 Н 年 □併用薬(一)の為、他の医薬品との相 □併用薬(一)の為、他の医薬品との相 □併用薬(一)の為、他の医薬品との相 互作用は無いと思われる。 万作用は無いと思われる。 互作用は無いと思われる。 □併用薬との相互作用について問題 □併用薬との相互作用について問題 □併用薬との相互作用について問題 ないと思われる。 ないと思われる。 ないと思われる。 □併用薬との相互作用について注意 □併用薬との相互作用について注意 □併用薬との相互作用について注意 相互作用 が必要(タガメット®で腎排泄抑制→ が必要(タガメット®で腎排泄抑制→ が必要(タガメット®で腎排泄抑制→ 血中濃度上昇。禁煙でニコチンの 血中濃度上昇。禁煙でニコチンの 血中濃度上昇。禁煙でニコチンの CYP1A2誘導消滅→テオフィリン製 CYP1A2誘導消滅→テオフィリン製 CYP1A2誘導消滅→テオフィリン製 剤、ワーファリン®の血中濃度上昇、 剤、ワーファリン®の血中濃度上昇、 剤、ワーファリン®の血中濃度上昇、 インスリンの用量調節) インスリンの用量調節) インスリンの用量調節) □きちんと飲んで、喫煙もしなかっ □きちんと飲んで、喫煙もしなかっ □きちんと飲んで、喫煙もしなかっ □いくつか残ったが、喫煙はしな □いくつか残ったが、喫煙はしな □いくつか残ったが、喫煙はしな かった。 かった。 アドヒアラかった。 □きちんと飲んだが、喫煙してし □きちんと飲んだが、喫煙してし □きちんと飲んだが、喫煙してし ンス まった。 まった。 まった。 □いくつか残ってしまい、喫煙もし □いくつか残ってしまい、喫煙もし □いくつか残ってしまい、喫煙もし てしまった。 てしまった。 てしまった。 □吸いたい衝動は無い。 □吸いたい衝動は無い。 □吸いたい衝動は無い。 喫煙の衝動□ある。 □ある。 □ある。 【□起床時 □食後 □一息ついた時 【□起床時 □食後 □一息ついた時 【□起床時 □食後 □一息ついた時 について その他 その他 □体重増加 □体重増加 □体重増加 服用後のイ □吐き気 □叶き気 □叶き気 ベントの □頭痛 □上腹部痛 □便秘 □お腹 □頭痛 □上腹部痛 □便秘 □お腹 □頭痛 □上腹部痛 □便秘 □お腹 発現につい の張り □普段と違う夢を見る の張り □普段と違う夢を見る の張り □普段と違う夢を見る て □不眠 □眠気 □不眠 □眠気 □不眠 □眠気 □その他[ □その他[ □その他[ □血液検査実施(一)の為判断不可。 □血液検査実施(一)の為判断不可。 □血液検査実施(一)の為判断不可。 □腎機能、他検査結果値での異常は □腎機能、他検査結果値での異常は □腎機能、他検査結果値での異常は 特にないと思われる。 特にないと思われる。 特にないと思われる。 □腎機能に異常あり。(添付文書に □腎機能に異常あり。(添付文書に □腎機能に異常あり。(添付文書に 血液検査 CCr<30:1日1回0.5mgから開始し以 CCr<30:1日1回0.5mgから開始し以 CCr<30:1日1回0.5mgから開始し以 後必要に応じ1回0.5mg、1日2回に 後必要に応じ1回0.5mg、1日2回に 後必要に応じ1回0.5mg、1日2回に 増量との記載有) 増量との記載有) 増量との記載有) □訴えなし。 □訴えなし。 □訴えなし。 精神面 □訴えあり。 □訴えあり。 □訴えあり。 について ] 指導箋 3 · 4 1 · 2 · 3 · 4 · 5 1 · 2 · 3 · 4 · 5 1 · 2 · メモ ppm] 呼気CO濃度[ ppm] 呼気CO濃度[ 呼気CO濃度[ [mqq 記入薬剤師